

Fédération Demeter Suisse

Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

Abattoir :

Date :

Producteur*trice :

Signature :

Points de contrôle

	e. o.	pas e. o.	non applicable	non contrôlé	Remarques, mesures
Déchargement des animaux et couloirs de circulations					
Manipulation apaisante des animaux ; <i>ne pas tordre la queue, ne pas taper les yeux, interdiction d'employer l'aiguillon électrique</i>					
Aucun animal ne dérape ou glisse					
Parcours sécurisé, animaux ne peuvent pas s'échapper					
Les animaux blessés/gravement handicapés sont étourdis et saignés tout de suite					
Parcs d'attente					
Les animaux qui ne se supportent pas sont séparés, p. ex. les animaux qui se battent					
Le nombre maximum d'animaux par parc d'attente est respecté					
Les animaux ont accès à de l'eau					
En cas d'hébergement de nuit : respect des besoins en espace, litière, alimentation et occupation					
Acheminement					
Couloir d'acheminement doit être clair, exempt d'obstacles (ombres, seuils)					
Déplacer les animaux avec ménagement : <i>ne pas tordre la queue, ne pas taper les yeux, pas de bruits forts</i>					
L'usage d'aiguillons électriques n'est admissible qu'à titre exceptionnel et si l'animal stimulé a la possibilité d'éviter l'action de l'aiguillon (l'aiguillon ne doit pas être porté à la main)					
Les animaux se dirigent vers la lumière					
Étourdissement (voir évaluation individuelle)					
Percuteur de remplacement en état de fonctionnement et à portée de main (au moins 1 pistolet à tige perforante)					
La pose du pistolet est chaque fois correcte*					
Les animaux sont bien étourdis*					
La qualité d'étourdissement est vérifiée : <i>les animaux étourdis de manière insuffisante sont immédiatement étourdis à nouveau*</i>					
Saignée					
Transformation ultérieure des carcasses au plus tôt 3 minutes après l'incision*					

* (résultats repris des tableaux ci-dessous)

Notes :

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à schlachtung@demeter.ch



Fédération Demeter Suisse

Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

Check-list pour l'évaluation de l'étourdissement électrique

Abattoir :

Contrôleur*euse :

Date :

Contrôler 10 % des animaux de chaque espèce (au moins 10 animaux, lorsque le nombre d'animaux est inférieur, contrôler tous les animaux)

Chiffres d'abattage (nombre d'animaux/jour)	Catégorie animale	Porcins	Ovins	Caprins	Autres
	Abréviation	por.	ovi.	cap.	

Légende : en ordre vide pas en ordre

Date	Catégorie animale	N° BDTA	Étourdissement en ordre/ne présente aucun des symptômes suivants : plus de 3 mouvements respiratoires, absence de crispations musculaires (convulsions), tentatives de se lever, l'animal donne de la voix, cligne spontanément des yeux	Second étourdissement nécessaire ? (Oui/Non)	Second étourdissement correct (Oui / Non)	la saignée est effectuée dans les ... secondes qui suivent l'étourdissement (au max. 30 sec. pour les porcins, 5 sec. pour les ovins et les caprins)	Minutes entre la saignée et la transformation ultérieure des carcasses (> 3min)

Nombre de manipulations correctes	<input type="text"/>	Remarques : <input type="text"/>
Nombre de manipulations mauvaises ou fautives	<input type="text"/>	
Nombre de mesures immédiates/secondes étourdissements	<input type="text"/>	

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à schlachtung@demeter.ch



Fédération Demeter Suisse

Autocontrôle abattoir gros et petit bétail : check-list destinée aux petites entreprises

État : janvier 2022

Check-list pour l'évaluation de l'étourdissement au pistolet à tige perforante Abattoir :

Contrôleur*euse : Date :

Contrôler 10 % des animaux de chaque espèce (au moins 10 animaux, lorsque le nombre d'animaux est inférieur, contrôler tous les animaux)

Catégorie animale	Bovins	Veaux	Porcins	Ovins	Caprins	Autres
Abréviation	bov.	vea.	por.	ovi.	cap.	

Légende : ✓ en ordre vide pas en ordre

Date	Catégorie animale	N° BDTA	Étourdissement en ordre/ne présente aucun des symptômes suivants : plus de 3 mouvements respiratoires, absence de crispations musculaires (convulsions), ne s'écroule pas tout de suite, l'animal donne de la voix, cligne spontanément des yeux	Second étourdissement nécessaire ? (Oui/Non)	Second étourdissement réussi (Oui / Non)	la saignée est effectuée dans les ... secondes qui suivent l'étourdissement (au max. 60 sec. pour les bovins, 20 sec. pour les ovins et caprins)	Minutes entre la saignée et la transformation ultérieure des carcasses (> 3min)

Nombre de manipulations correctes	<input type="text"/>	Remarques : <input type="text"/>
Nombre de manipulations mauvaises ou fautives	<input type="text"/>	
Nombre de mesures immédiates/seconds étourdissements	<input type="text"/>	

Merci de remplir ce formulaire et de l'envoyer à schlachtung@demeter.ch